

無痛分娩マニュアル

(2025年3月22日 改定)

I. 硬膜外麻酔穿刺時の準備と介助

- ① 輸液、モニター、シリンジポンプの確認
- ② 介助者も帽子マスクを着用
- ③ NST 所見と内診所見の確認
- ④ 穿刺体位（右側臥位）の介助



II, 必要物品

〈薬剤〉

- ① 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ② 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ③ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ④ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml

〈物品〉

- ① 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ② 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ③ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ④ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ⑤ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ⑥ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ⑦ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ⑧ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ⑨ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)
- ⑩ 硬膜外カテーテル (18G, 20cm)



III, 麻酔開始後の管理

硬膜外麻酔持続時の薬剤

- ① 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ② 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ③ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ④ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ⑤ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ⑥ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ⑦ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ⑧ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ⑨ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml
- ⑩ 0.5%ブupivacaine 10ml (0.5mg/ml) 10ml